

UVEÍTE ANTERIOR EM PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

PREVIOUS UVEITIS IN PATIENTS WITH ANQUILOSANT SPONDILITE: AN INTEGRATING LITERATURE REVIEW

Glaice Martins Bezerra da Cruz¹
Renata Livia Fonseca Moreira de Medeiro²
Jean Carlos Abrantes Diniz³
Ricardo Lourenço Coelho⁴

RESUMO: Objetivo: Revisar a literatura sobre a presença de uveíte anterior em pacientes com espondilite anquilosante. **Metodologia:** Trata-se de um estudo realizado por meio da revisão integrativa da literatura, método específico que sintetiza os resultados obtidos em estudos já realizados. A pesquisa foi conduzida nos meses de abril a junho de 2018, por meio da base de dados disponíveis na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e na Publicações Médicas (PubMed), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): espondiloartropatias, espondilite anquilosante e uveíte anterior. **Resultados:** Primeiramente foi realizado a pesquisa nas bases de dados selecionadas, utilizando os DeCS isoladamente. Em seguida, foram agrupados aos pares associados ao descritor Booleano AND e aplicados os filtros de acordo com os critérios de inclusão. E para um melhor refinamento no número de artigos, procedeu-se a associação dos três descritores citados, na qual foram encontrados 30 artigos. Posteriormente, foi realizada a leitura na íntegra e incluídos 05 estudos, para o desenvolvimento dos resultados. **Discussões:** A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica, de caráter progressivo, com predileção pelo esqueleto axial, incluindo as articulações sacroilíacas. O início da doença ocorre

¹ Acadêmica do Curso de Bacharelado em Medicina da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - PB. email: glaicebezerra1@gmail.com.

² Doutora pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (2013). Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas (2008). Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (2003). Docente da Faculdade Santa Maria.

³ Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (2002). Diretor Técnico do Hospital Regional de Cajazeiras - PB. Docente do Curso de Medicina da Faculdade Santa Maria.

⁴ Médico Oftalmologista. Graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (1996). Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande e da Faculdade Santa Maria.

habitualmente entre a segunda à terceira décadas de vida, e acomete preferencialmente indivíduos do gênero masculino, caucasianos e HLA-B27-positivos. As uveítes decorrentes das espondiloartrites costumam ser anteriores, agudas, recorrentes, unilaterais, alternantes e com baixo grau de complicação. **Conclusão:** Conclui-se que a uveíte anterior aguda é a característica extra-articular mais comum da espondilite anquilosante. Sendo essencial a identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento precoce aos serviços especializados. Sendo assim, é fundamental a contribuição mútua entre os Oftalmologistas e Reumatologistas, para o seguimento adequado desses pacientes.

Descritores: Espondiloartropatias, Espondilite Anquilosante e Uveíte Anterior.

ABSTRACT: Objective: To review the literature on the presence of anterior uveitis in patients with ankylosing spondylitis. **Methodology:** This is a study carried out through an integrative review of the literature, a specific method that synthesizes the results obtained in previous studies. The research was conducted in the months of April to June 2018, through the database available in the Virtual Health Library (VHL): Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and PubMed, using the following Health Sciences Descriptors (DeCS): spondyloarthropathies, ankylosing spondylitis and anterior uveitis. **Results:** First the research was carried out in the selected databases, using DeCS alone. They were then grouped into pairs associated with the Boolean descriptor AND and the filters were applied according to the inclusion criteria. And for a better refinement in the number of articles, we proceeded to associate the three descriptors mentioned, in which 30 articles were found. Subsequently, the full reading was carried out and 05 studies were included for the development of the results. **Discussion:** Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, progressive inflammatory disease with a predilection for the axial skeleton, including the sacroiliac joints. The onset of the disease usually occurs between the second and third decades of life, and mainly affects males, Caucasian and HLA-B27-positive individuals. Uveitis due to spondylarthritis is usually anterior, acute, recurrent, unilateral, alternating, and with a low degree of complication. **Conclusion:** It is concluded that acute anterior uveitis is the most common extra-articular characteristic of ankylosing spondylitis. Being essential the identification of the disease in its initial stage and the early referral to the specialized services. Therefore, it is fundamental the mutual contribution between Ophthalmologists and Rheumatologists, for the adequate follow-up of these patients.

Descriptors: Spondyloarthropathies, Ankylosing Spondylitis and Anterior Uveitis.