

ACIDENTES OCUPACIONAIS COM PÉRFUROCORTANTES: ESTUDO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

*OCCUPATIONAL ACCIDENTS SHARPS: STUDY WITH NURSING
PROFESSIONALS*

Irinete de Araújo Salviano Lima¹
Geane Gadelha de Oliveira²
Alba Rejane Gomes Rodrigues³
Milena Nunes Alves de Sousa⁴

RESUMO - Introdução: sabe-se que o trabalho, quando executado sob determinadas condições, pode causar doenças, encurtar a vida, ou mesmo matar os trabalhadores. Os profissionais de saúde, principalmente os de enfermagem, os quais tem contato direto com os pacientes, estão mais expostos à ocorrência de acidentes ocupacionais. **Objetivo:** analisar a ocorrência de acidentes ocupacionais com perfurocortantes entre os profissionais de enfermagem. **Método:** tratou-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Participaram do estudo 35 profissionais de saúde da enfermagem. **Resultados:** quanto à faixa etária variou entre 18 a 55 anos, apresentando maior frequência de 26 a 35 anos (42%). Dentre os entrevistados 68,6% sofreram algum tipo de acidente de trabalho, destes 65,7% com material perfurocortantes, ocasionados com maior frequência por falta de atenção (34,8%) e pressa no decorrer do plantão (34,8%). Ainda, 97% dos acidentes não foram notificados e 83% dos profissionais possuíam esquema vacinal completo. **Conclusão:** a pesquisa possibilitou verificar a ocorrência de acidentes de trabalho com os profissionais de enfermagem, decorrente majoritariamente do manuseio de perfurocortantes. Medidas preventivas devem ser dotadas para redução da acidentabilidade, tais como planejar e implementar programas de orientação específicos aos trabalhadores de enfermagem, para que estes adotem um exercício profissional seguro.

Palavras-Chave: Acidentes de Trabalho. Enfermagem. Saúde do Trabalhador.

¹ Estudante de Enfermagem pelas Faculdades Integradas de Patos.

² Enfermeira, Especialista em Saúde da família e Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Docente pelas Faculdades Integradas de Patos. Mestranda pela SOBRATI em São Paulo em Terapia Intensiva.

³ Enfermeira e Professora Mestre das Faculdades Integradas de Patos.

⁴ Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde. Doutoranda em Administração pela UNINTER e Doutora em Promoção de Saúde pela UNIFRAN. Professora na FSM e FIP.

ABSTRACT - Introduction: it is known that the work, when executed under certain conditions, can cause disease, shorten life or even kill workers. Health professionals, especially nurses, who have direct contact with patients, are more susceptible to the occurrence of occupational accidents. **Objective:** to analyze the occurrence of occupational sharps injuries among nursing professionals. **Method:** this is a descriptive study with a quantitative approach. The study included 35 healthcare professionals in nursing. **Results:** the age range was between 18-55 years, with greater frequency 26-35 years (42%). Among the respondents 68.6% have suffered some sort of accident at work, 65.7% of these sharps material, most often caused by lack of attention (34.8%) and in a hurry during the shift (34.8%). Still, 97% of accidents were not reported and 83% of professionals had completed their vaccination schedule. **Conclusion:** the survey enabled us to verify the occurrence of work injuries and nursing professionals, mostly due to handling of sharps. Preventive measures should be provided to reduce related injuries, such as plan and implement educational programs specific to the nursing staff so that they can adopt a safe professional practice.

Keywords: Accidents at Work. Nursing. Occupational Health.