

DOI: 10.35621/23587490.v9.n1.p651-664

CIRURGIA DE REMOÇÃO DO FREIO LABIAL SUPERIOR EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO

SURGERY TO REMOVE THE UPPER LABIAL FRENCH IN A PEDIATRIC PATIENT: CASE REPORT

Wanda Vitória Martins de Belchior¹
Amanda Gomes Tavares Lucena²
Antônio Teodoro de Alencar Filho³
Alandeilson Alexandre da Silva⁴
Tayná Ribeiro Monteiro de Figueiredo⁵
Cláudia Batista Vieira de Lima⁶

INTRODUÇÃO: Os freios labiais são alterações anormais na mucosa, e podem ser descritos como uma dobra da membrana mucosa que contém músculo e fibras conjuntivas que ligam o lábio e a bochecha à mucosa alveolar, à gengiva e ao periosteio subjacente. Este trabalho tem como justificativa a devolução da harmonia do sorriso, alinhamento dental, adequação fonética, favorecer a melhor higiene bucal e qualidade de vida do paciente. **OBJETIVO:** Desta pesquisa foi realizar procedimento cirúrgico para remoção do freio labial superior, por indicação ortodôntica, em paciente pediátrico. **MÉTODO:** Este caso clínico descreve o tratamento cirúrgico para remoção do freio labial superior em um paciente do sexo feminino, com idade de 08 anos, que apresentava indicação para cirurgia de frenectomia labial superior. O procedimento cirúrgico foi realizado na Clínica Escola da Faculdade Santa Maria, na cidade de Cajazeiras - Paraíba. O caso foi registrado através de fotografias. Para a execução do caso, foi usada a técnica de Archer; para tanto, a paciente foi submetida ao anestésico local, lidocaina com epinefrina 1.100:0000, 02 tubetes; logo após administração anestésica, foi realizada a incisão cirúrgica, em seguida, a sutura, e, após 10 dias, a remoção dos pontos. O caso foi realizado com êxito. **RESULTADOS:** Diante do exposto, percebe-se que é de suma importância que clínicos gerais, especialistas e o odontopediatras saibam reconhecer as características normais do freio labial, e quando existe comprometimento funcional. Logo, o plano de tratamento deve ser feito de forma

¹ Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - Paraíba.

² Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - Paraíba.

³ Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - Paraíba.

⁴ Residente em Saúde da Família e Comunidade - SMS João Pessoa - Paraíba.

⁵ Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - Paraíba.

⁶ Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras - Paraíba.

cuidadosa, sendo o paciente avaliado desde o tipo de freio, sua localização e inserção, para, assim, determinar a intervenção cirurgica, que deve ocorrer no momento adequado, e ser executada por um profissional atento a melhor técnica. **CONCLUSÃO:** É importante destacar que os benefícios apresentados após a remoção do freio labial agregam qualidade de vida ao paciente, bem como melhoria da higiene e fonação, autoestima.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Bucal; Odontopediatria; Freio Labial.