

DOI: 10.35621/23587490.v10.n1.p964-976

ATENÇÃO FARMACÊUTICA RELACIONADA AO USO IRRACIONAL DOS BENZODIAZEPÍNICOS EM PACIENTES IDOSOS

Francisco Eduardo Batista Mota¹
Iris Costa e Sá Lima²
José Guilherme Ferreira Marques Galvão³
Rafaela de Oliveira Nóbrega⁴

RESUMO: Este estudo tem como principal objetivo compreender a importância da atenção farmacêutica relacionada ao uso irracional dos benzodiazepínicos em pacientes idosos. O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Esta revisão integrativa ocorreu com a seleção dos descritores a empregados a partir de consulta aos Descritores em Ciências da Saúde, sendo as bases de dados utilizadas para o levantamento da amostragem para dar suporte a este trabalho de revisão, tendo como foco a literatura acadêmica especializada e como base, os dados do LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e SciELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Como resultado após filtro sistemático, restaram 18 publicações encontradas que abordaram a temática proposta, sendo que 07 artigos foram selecionados para discussão. Após leitura exploratória e crítica, os artigos foram organizados por título, periódico, autor, ano e resultados. Assim, concluiu-se com esta pesquisa, que houve um aumento considerável de uso irracional de benzodiazepínicos entre idosos, evidenciado principalmente uma fragilidade no sistema público e principalmente na dispensação desse tipo de fármaco. O farmacêutico tem papel primordial no que tange o uso indiscriminado de benzodiazepínicos, uma vez que este profissional tem autonomia para orientar sobre riscos e benefícios, assim como rejeitar prescrições inadequadas, visando à qualidade de vida do indivíduo e baseado no código de ética de sua profissão.

Palavras-chave: atenção farmacêutica, medicamento, benzodiazepínicos, idoso.

ABSTRACT: The main objective of this study is to understand the importance of pharmaceutical care related to the irrational use of benzodiazepines in elderly patients.

¹ Discente do curso de Farmácia da UNISM; eduardomoralcz@gmail.com.

² Docente da UNISM e Especialista em Farmacologia; iris.csa@hotmail.com.

³ Docente da UNISM Doutor em farmacologia; guilhermefirst@gmail.com.

⁴ Docente da UNISM e Mestre em farmacologia; rafaelaonobregaa@gmail.com.

The study is an integrative literature review. This integrative review took place with the selection of the descriptors and employees from consultation with the Descriptors in Health Sciences, the databases being used for the sampling survey to support this review work focused on the specialized academic literature having as its bases on data from LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), and SciELO (Scientific Electronic Library Online) and BVS (Virtual Health Library). As a result, after a systematic filter, 18 publications were found that addressed the proposed theme, and 07 articles were selected for discussion. After exploratory and critical reading, the articles were organized by title, journal, author, year and results. Thus, it was concluded from this research that there was a considerable increase in the irrational use of benzodiazepines among the elderly, mainly evidenced by a weakness in the public system and mainly in the dispensing of this type of drug. The pharmacist has a key role regarding the indiscriminate use of benzodiazepines, since this professional has the autonomy to advise on risks and benefits, as well as reject inappropriate prescriptions, aiming at the individual's quality of life and based on the code of ethics of his profession.

Keywords: pharmaceutical care, medicine, benzodiazepines, elderly.